




高血压+肥胖

- 患者女性，52岁，间断头晕、头痛2年、加重半月
- 既往史：高血压病史2年



- 检查：BP：168/98 mmHg
TG：3.1 mmol/L，TC：5.8 mmol/L，LDL-C：3.7 mmol/L，HDL-C：0.8 mmol/L
FBG：6.8 mmol/L，BMI：29kg/m²
- 诊断：1高血压病2级，高危组，2 混合型高脂血症，3 IFG

力清之®强效降低LDL-C综合改善血脂谱

研究1：273例高脂血症伴血清总胆固醇
≥220mg/dl患者，随机接受
匹伐他汀1mg/d、2mg/d、
4mg/d治疗12周。

研究2：313例高脂血症患者，最初服用匹伐
他汀2mg的剂量，根据患者的症状
加至4mg/日或减少至1mg/d，
随访52周。

研究3：LIVES研究亚组分析，20279例
高胆固醇血症患者，旨在评价
匹伐他汀对患者血脂尤其是HDL-C的疗效。

LDL-C

TG

25%³

HDL-C


42%¹

31%²

Kowa

202

力清之® 不增加新发糖尿病(NOD)风险¹



2016年的一项网状Meta分析，纳入29项研究共163039例参与者，其中141863为非糖尿病患者，评估不同他汀药物的NOD风险¹

*该研究为荟萃分析，不同的研究采用的药物剂量不同，且在研究中会根据患者的血脂情况调整降脂药剂量

¹ Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;10):1131-1149



扫码了解力清之®
不影响血糖代谢的机制

大量研究数据表明，匹伐他汀是目前惟一未见 增加新发糖尿病的他汀类药物¹

《2016中国成人血脂异常防治指南》：代谢综合征的调脂目标是LDL-C < 2.6 mmol/L、
TG < 1.7 mmol/L、HDL-C ≥ 1.0mmol/L²

力清之简明处方资料

【通用名】匹伐他汀钙片 【成分】本品活性成份为匹伐他汀钙 【适应症】高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症 【规格】2mg
【用法用量】通常，成人1日1次，口服匹伐他汀钙1-2mg。按照年龄和治疗反应适宜增减剂量，在LDL-胆固醇降低不充分的情况下可以增量，
每日最大给药量为4mg 【贮藏】遮光、密闭保存 【包装】PTP包装，7片/盒、10片/盒 【有效期】36个月 【执行标准】进口药品
注册标准 JX20100060 【批准文号】进口药品注册证号 H20140417



施维雅（天津）制药有限公司

中国联络处地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西座6层
邮编：100020 电话：(010)65610341 传真：(010)65610348 网址：<http://www.servier.com.cn>



興和製藥（中國）有限公司

中国联络处地址：上海市南京西路128号永新广场17楼
邮编：200003 电话：021-63403803 传真：021-63403807 生产企业：日本兴和株式会社
公司地址：日本国名古屋市锦三丁目6-29 网址：<http://www.kowashanghai.cn>



